

LA FOURBURE

Pour un traitement réussi:

1. Est-ce la fourbure ?
2. Faire un diagnostic, traiter/enlever la cause (le passé du cheval, des signes cliniques, des analyses de sang).

Il y a trois catégories de causes :

- a) Le syndrome de réaction d'une inflammation systémique (Systemic Inflammatory Response Syndrome) : le cheval a une maladie systémique avec de la fièvre ; la fourbure est secondaire—il faut d'abord traiter la maladie initiale: une colique, une septicémie, un placenta retenue, une surconsommation de granulés
 - b) Une fourbure due à un excès de poids sur un membre: boiterie sévère dans l'autre membre pendant quelques temps à cause d'une fracture, ou d'une infection dans les joints, par exemple.
 - c) Une origine endocrinienne: environ 90% des cas de fourbures – et 100% des cas de fourbures qui sont dus à l'herbe - sont dus soit au Syndrome Métabolique Equin (EMS) ou au PPID (syndrome de Cushing).
3. Soutenir et réaligner les sabots (en faisant des radios, puis parage de pieds).

Les symptômes de la fourbure :

On verra rarement toutes ces signes en même temps. Si vous en voyez un de ces symptômes, on peut penser à une fourbure et il vaut mieux appeler le vétérinaire:

- il reporte son poids d'un membre à l'autre
- le pouls digital est important
- le cheval cherche un sol mou – il ne marche pas bien sur un sol dur (des pas assez rapprochés sur un sol dur)
- il a de la difficulté à tourner
- il a une allure raide—il marche sur ses talons
- il ne veut pas bouger, ou ne bouge plus du tout
- il a une position anormale (tout dépend si ses pieds sont atteints et s'il y a basculement, ou descente de la 3ème phalange)
- il refuse de donner le pied, ou a du mal à donner le pied
- les pieds sont plus chauds que d'habitude (ou plus froids)
- il a une tension musculaire dans les épaules, le dos ou les hanches: il peut y avoir des taux élevés d'AST et de CPK
- il y a une douleur dans la sole en appuyant entre l'apex de la fourchette et la pince
- il se couche plus souvent
- il y a des signes de douleurs: le pouls (à plus de 80 bpm ?), la respiration (à plus de 60 bpm ?), des tremblements, une transpiration, la dépression, le manque d'appétit.

Les symptômes de la fourbure chronique:

Si votre cheval présente une seule ou plusieurs des signes ci-dessous, et bien des semaines après l'apparition de la fourbure - on pourra considérer que nous rentrons dans la phase de la fourbure chronique. Faites faire des radios.

- L'apparition des anneaux sur les sabots qui sont plus écartés vers les talons
- Les sabots poussent anormalement – les talons poussent plus vite que les pinces
- La ligne blanche est étirée ou est remplacée par une cannelure profonde et noire entre la paroi et la sole ou il y a une cavité laminaire (laminar wedge)
- Il y a du sang séché dans la ligne blanche ou dans la paroi

Ce document a pour but d'informer, et ne peut en aucun cas être remplacé par une consultation vétérinaire pour avis. Si vous avez le moindre doute que votre cheval est malade et soupçonne qu'il fait une fourbure, veuillez consulter votre vétérinaire.

- Il y a un changement dans l'angle des parois du sabot
- La paroi du sabot est évasée, il y a des fêlures
- Il y a une dépression juste au-dessus de la couronne ou une inflammation sur la bande de la couronne.
- Des bleus sur la sole, devant la fourchette (en dessous de la pointe de la P3)
- La sole est amincie, ou peut être très épaisse
- Une sole bombée, convexe ou tombante ronflée????
Une pénétration de la sole par la P3
- Des cannelures collatérales plus profondes à l'arrière de la fourchette qu'à l'avant?

Le traitement d'urgence pour la fourbure

- appeler le vétérinaire et le maréchal ferrant
- enlever le cheval de l'herbe (le bouger le moins possible et donner un support aux pieds avant de le bouger)
- le mettre sur une litière épaisse avec des copeaux, du sable ou du gravier
- donner un support aux pieds, si la litière n'est pas suffisante
- donner des anti-inflammatoires, telles que bute, Danilon, ou Equioxx, pour douleur et inflammation
- faire une thérapie de froid sur les pieds, si la cause de la fourbure ne provient pas du froid, pour réduire l'inflammation et la douleur

Le traitement à long terme

- nourrir (entre 1,5 à 2% du poids du cheval) avec du foin à moins de 10% NSC (hydrates de carbones non-solubles) + des minéraux, vitamines, protéines et lin? – ne pas le priver de manger
- faire diagnostiquer la cause : faire des analyses de sang pour la recherche d'insuline et glucose pour EMS (insulino-résistance), et ACTH pour PPID (syndrome de Cushing).
- Traiter la cause: avec la Pergolide pour PPID et régime et à la rigueur, du Metformine pour EMS.
- Faire des radios latérales pour déterminer les dégâts et pour voir s'il y a un basculement de la 3^{ème} phalange
- Faire parer les pieds et réaligner s'il y a basculement